

Désherbage des céréales : assurer l'efficacité



ETAT DES LIEUX

- Accès aux parcelles limité par un début d'hiver relativement pluvieux :
 - peu de traitement à l'automne (sauf dans l'Ouest)
 - parcelles avec des niveaux de salissement importants

PARAMETRES A RECHERCHER

- Intervenir dès que possible (adventices avant fin tallage)
- Traiter sur des plantes bien hydratées en sol frais
- Éviter les amplitudes thermiques les jours suivants
- Rechercher du rayonnement lors de l'application
- Bonne hygrométrie > 60%




Risque : traitement sur des adventices trop développées = possibilité d'échec des désherbages



FOCUS SUR LA TRIPLE ADJUVANTATION


La triple adjuvantation est une solution technique non systématique à réserver à certaines situations :

- ◆ adventices développées
- ◆ salissements importants
- ◆ conditions climatiques stressantes



PERFORMANCES

Désherbage antigraminées
Résultats des pôles expert JD - 2013
% d'efficacité contre vulpin - épiaison



VOLUME DE BOUILLIE	DOSE EMPLOI SURF 2000®
< à 100 l d'eau	• 0,10 %
de 100 à 150 l d'eau	• 0,1 litre/ha
de 150 à 200 l d'eau	• 0,15 litre/ha
> à 200 l d'eau	• 0,2 litre/ha

SURF 2000®: formulation EC contenant 50 % de polysorbate 20 + 50 % de polymère d'amine grasse. Classement: H410 N° AMM 9700577 - Responsable de la mise en marché: JOUFFRAY-DRILLAUD - La Cour d'Hénon - 4 avenue de la CE - 86170 Cissé Propriété Jouffray-Drillaud - Respecter les conditions d'emploi